


# PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS EN LECHE



LA PRODUCCIÓN DE LECHE SIN RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS ES UNA OBLIGACIÓN EN EL TAMBO

## Recomendaciones:

- 1- Prevenir la mastitis
- 2- Identificar vacas enfermas y con tratamientos.  
Use cintas en las patas, pintura, aerosol. Use colores bien visibles.
- 3- Hacer un lote de vacas enfermas y con tratamientos, apartándolas del resto.
- 4- Ordeñar las vacas enfermas y con tratamientos al final del ordeño.
- 5- Descartar toda la leche aunque el tratamiento haya sido en un solo cuarto.  
No enviar a usina.
- 6- Guardar los antibióticos de forma ordenada.  
Conservarlos en las cajas, sus etiquetas y prospectos para leerlos y respetar sus indicaciones.  
No usar productos para vacas secas en vacas lactantes.
- 7- Aplicar dosis indicada por el veterinario y no excederse. Más antibiótico no elimina más microorganismos, pero si aumenta el tiempo de presencia del antibiótico en la leche.
- 8- Respetar el período de descarte de leche.
- 9- Registrar el N° de caravana de vacas enfermas y/o tratadas, en cuaderno de registros diario de eventos: identificación de la vaca, fecha, producto utilizado y responsable del tratamiento.
- 10- Registrar fechas de tratamiento, secado y parto.  
La leche de vacas paridas con períodos cortos de secado debe descartarse.

SI TIENE DUDAS SOBRE PRESENCIA DE ANTIBIÓTICOS EN LECHE DE VACAS O TANQUE CONSULTE AL INSPECTOR DEL SISTEMA DE CONTROL LECHERO CENTRALIZADO.

Dispone de un test rápido para detección de residuos antibióticos en leche.

¡No se arriesgue!